



【用法用量】

（1）皮肤及其附件损害：牛皮癣、银屑病、接触性皮炎等。

（2）神经系统损害：癫痫发作、无抽搐性癫痫等。

（3）呼吸系损害：急性呼吸窘迫综合征、肺水肿、支气管痉挛等。

（4）心血管系损害：低血压、心动过速、心律失常等。

（5）血液系损害：血小板减少、贫血、白细胞减少等。

（6）其他：过敏反应、注射部位疼痛等。

【禁忌】

对本品或本品所含任何成分过敏者禁用。

【注意事项】

1. 本品为处方药，应在医生指导下使用。

2. 本品可能引起过敏反应，如皮疹、瘙痒、呼吸困难等，严重者可危及生命。

3. 本品可能引起低血压，使用时应密切监测血压。

4. 本品可能引起心动过速，使用时应密切监测心率。

5. 本品可能引起血小板减少，使用时应密切监测血常规。

6. 本品可能引起白细胞减少，使用时应密切监测血常规。

7. 本品可能引起注射部位疼痛，使用时应缓慢注射。

8. 本品可能引起头晕、头痛、乏力等不适，如症状严重，应及时停药并就医。

9. 本品可能引起视力模糊，使用时应避免驾驶或操作机械。

10. 本品可能引起味觉异常，如口中金属味、苦味等。

11. 本品可能引起口干、口渴等不适。

12. 本品可能引起便秘、腹泻等胃肠道反应。

13. 本品可能引起尿色加深，如尿液呈红色、棕色等，属正常现象。

14. 本品可能引起月经紊乱，如经量增多、减少、闭经等。

15. 本品可能引起乳汁分泌减少，哺乳期妇女慎用。

16. 本品可能引起肾功能损害，使用时应密切监测肾功能。

17. 本品可能引起肝功能损害，使用时应密切监测肝功能。

18. 本品可能引起甲状腺功能异常，使用时应密切监测甲状腺功能。

19. 本品可能引起电解质紊乱，如低钾血症、低钙血症等。

20. 本品可能引起脱水，使用时应多饮水。

21. 本品可能引起体温升高，如发热、寒战等。

22. 本品可能引起寒战、发冷等不适。

23. 本品可能引起出汗、潮热等不适。

24. 本品可能引起皮肤干燥、皲裂等不适。

25. 本品可能引起指甲、头发脱落等不适。

26. 本品可能引起味觉、嗅觉异常。

27. 本品可能引起听力、视力下降等不适。

28. 本品可能引起记忆力、注意力下降等不适。

29. 本品可能引起情绪波动、焦虑、抑郁等不适。

30. 本品可能引起失眠、嗜睡等不适。

31. 本品可能引起疲劳、乏力等不适。

32. 本品可能引起食欲不振、消化不良等不适。

33. 本品可能引起体重增加、减轻等不适。

34. 本品可能引起月经不规律、痛经等不适。

35. 本品可能引起不孕症、流产、早产等不适。

36. 本品可能引起胎儿畸形、发育不良等不适。

37. 本品可能引起哺乳期乳汁分泌减少、质量下降等不适。

38. 本品可能引起哺乳期婴儿体重增加、减少等不适。

39. 本品可能引起哺乳期婴儿腹泻、便秘等不适。

40. 本品可能引起哺乳期婴儿皮疹、瘙痒等不适。

41. 本品可能引起哺乳期婴儿呼吸困难、咳嗽等不适。

42. 本品可能引起哺乳期婴儿低血压、心动过速等不适。

43. 本品可能引起哺乳期婴儿血小板减少、贫血等不适。

44. 本品可能引起哺乳期婴儿白细胞减少等不适。

45. 本品可能引起哺乳期婴儿其他不良反应。

【不良反应】

本品不良反应发生率与剂量、疗程、个体差异等因素有关。常见不良反应包括：头痛、头晕、乏力、口干、口渴、便秘、腹泻、恶心、呕吐、食欲不振、消化不良、腹痛、腹胀、皮疹、瘙痒、潮热、寒战、出汗、畏寒、发热、寒战、发冷、体温升高、低血压、心动过速、心律失常、头晕、眼花、视力模糊、听力下降、味觉异常、嗅觉异常、口干、口渴、皮肤干燥、皲裂、指甲、头发脱落、月经紊乱、不孕症、流产、早产、胎儿畸形、发育不良、哺乳期乳汁分泌减少、质量下降、哺乳期婴儿体重增加、减少、腹泻、便秘、皮疹、瘙痒、呼吸困难、咳嗽、低血压、心动过速、血小板减少、贫血、白细胞减少等。

【药物相互作用】

本品与下列药物合用可能产生相互作用，应在医生指导下使用：

1. 本品与抗凝药合用，可能增加出血风险。

2. 本品与降压药合用，可能增加低血压风险。

3. 本品与降糖药合用，可能增加低血糖风险。

4. 本品与利尿剂合用，可能增加电解质紊乱风险。

5. 本品与免疫抑制剂合用，可能增加感染风险。

6. 本品与化疗药合用，可能增加骨髓抑制风险。

7. 本品与麻醉药合用，可能增加呼吸抑制风险。

8. 本品与镇静药合用，可能增加嗜睡风险。

9. 本品与抗癫痫药合用，可能影响抗癫痫药血药浓度。

10. 本品与避孕药合用，可能影响避孕药效果。

11. 本品与维生素D合用，可能增加高钙血症风险。

12. 本品与维生素K合用，可能影响凝血功能。

13. 本品与华法林合用，可能增加出血风险。

14. 本品与地高辛合用，可能增加地高辛毒性。

15. 本品与锂盐合用，可能增加锂盐毒性。

16. 本品与茶碱合用，可能增加茶碱毒性。

17. 本品与地西泮合用，可能增加地西泮毒性。

18. 本品与丙泊酚合用，可能增加丙泊酚毒性。

19. 本品与咪达唑仑合用，可能增加咪达唑仑毒性。

20. 本品与芬太尼合用，可能增加芬太尼毒性。

21. 本品与舒芬太尼合用，可能增加舒芬太尼毒性。

22. 本品与瑞芬太尼合用，可能增加瑞芬太尼毒性。

23. 本品与阿片类药物合用，可能增加阿片类药物毒性。

24. 本品与吸入麻醉药合用，可能增加吸入麻醉药毒性。

25. 本品与静脉麻醉药合用，可能增加静脉麻醉药毒性。

26. 本品与局部麻醉药合用，可能增加局部麻醉药毒性。

27. 本品与神经肌肉阻滞剂合用，可能增加神经肌肉阻滞剂毒性。

28. 本品与β受体阻滞剂合用，可能增加β受体阻滞剂毒性。

29. 本品与钙通道阻滞剂合用，可能增加钙通道阻滞剂毒性。

30. 本品与利尿剂合用，可能增加利尿剂毒性。

31. 本品与抗心律失常药合用，可能增加抗心律失常药毒性。

32. 本品与抗血小板药合用，可能增加抗血小板药毒性。

33. 本品与抗凝药合用，可能增加抗凝药毒性。

34. 本品与免疫抑制剂合用，可能增加免疫抑制剂毒性。

35. 本品与化疗药合用，可能增加化疗药毒性。

36. 本品与放疗合用，可能增加放疗毒性。

37. 本品与手术合用，可能增加手术风险。

38. 本品与输血合用，可能增加输血风险。

39. 本品与器官移植合用，可能增加器官移植风险。

40. 本品与疫苗接种合用，可能影响疫苗接种效果。

41. 本品与活疫苗合用，可能增加活疫苗毒性。

42. 本品与灭活疫苗合用，可能影响灭活疫苗效果。

43. 本品与狂犬病疫苗合用，可能影响狂犬病疫苗效果。

44. 本品与破伤风疫苗合用，可能影响破伤风疫苗效果。

45. 本品与流感疫苗合用，可能影响流感疫苗效果。

46. 本品与新冠疫苗合用，可能影响新冠疫苗效果。

47. 本品与新冠疫苗合用，可能增加新冠疫苗不良反应。

48. 本品与新冠疫苗合用，可能影响新冠疫苗免疫原性。

49. 本品与新冠疫苗合用，可能影响新冠疫苗有效性。

50. 本品与新冠疫苗合用，可能影响新冠疫苗安全性。

【药物过量】

本品尚无过量用药的临床研究数据。如发生本品过量用药，应立即停药并就医。

【药理毒理】

本品为处方药，其药理毒理作用尚不明确。

【药代动力学】

本品在人体内半衰期约为35小时。

【规格】

每瓶0.5g

【贮藏】

遮光，密封，阴凉处保存。

【有效期】

36个月

【批准文号】

国药准字S20000001

【生产企业】

博晖生物制药(河北)有限公司

企业名称：博晖生物制药(河北)有限公司

生产地址：石家庄市藁城区火炬开发区青礼路6号

注册证号：冀药证字(2019)第0200号

电话号码：0311-83935518